



يجب عزل المصاب  
بالسرطان، لحين شفائه.

لا تلزم المبالغة بالخوف وحماية المصاب  
بعزله دون توصية الطبيب، وانما يكتفى  
بالحفاظ على نظافة محيطه وعدم مخالطته  
للمرضى الآخرين، أثناء فترة العلاج وخاصةً  
عند انخفاض المناعة وذلك  
لسهولة انتقال العدوى.






يزيد ارتداء حمالة  
الصدر نسبة الإصابة  
بسرطان الثدي




حتى الآن لا توجد أي دراسة تثبت  
أن هناك علاقة بين ارتداء حمالة الصدر  
والإصابة بسرطان الثدي






جميع الكتل التي تظهر في  
الثدي هي اورام سرطانية!



ظهور الكتل لا يعني بالضرورة انها  
سرطان، فقد تكون بسبب وجود تكيسات  
أو عدوى، بالرغم من ذلك يجب عليك  
عدم اهمالها ومراجعة الطبيب المختص  
لفحصها.





زراعة الثدي بالسيلكون مثلاً  
تزيد من احتمالية الإصابة  
بسرطان الثدي.



لا توجد علاقة بين زراعة الثدي وزيادة  
خطورة تكوّن سرطان الثدي. وإنما تبقى  
احتمال اصابتك كاحتمال اصابة بقية نساء  
المجتمع، مع الأخذ بعين الإعتبار عوامل  
الخطورة المحيطة بك .

